

# Bruchgleichungen

MATHEMATIK • TERME UND GLEICHUNGEN • HANDOUT UND ÜBUNG

12 Stücke Pizza werden auf  $x$  Personen verteilt: Jede Person bekommt  $\frac{12}{x}$  Stücke. Steht die Variable im **Nenner**, heißt der Term **Bruchterm**.

## DEFINITIONSMENGE

Der Nenner darf nie 0 sein. Die Zahlen, die man einsetzen darf, bilden die **Definitionsmenge**  $D$ .

$$\frac{12}{x}: D = \mathbb{Q} \setminus \{0\} \quad \frac{x+1}{x-3}: D = \mathbb{Q} \setminus \{3\}$$

## BEISPIEL

$$\begin{array}{ll} \frac{6}{x-2} = 3 & | \cdot (x-2) \\ 6 = 3 \cdot (x-2) & \text{ausmultiplizieren} \\ 6 = 3x - 6 & | + 6 \\ 12 = 3x & | : 3 \\ x = 4 & 4 \in D = \mathbb{Q} \setminus \{2\} \checkmark \end{array}$$

**TIPP** Fehler: Prüfe immer  $D$ !  $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2}$  gibt  $x = 2$ . Aber für  $x = 2$  ist der Nenner 0:  $2 \notin D$ , also  $L = \{\}$ .

## ÜBUNGEN

## AUFGABE 1



Gib die Definitionsmenge an.   a)  $\frac{5}{x}$    b)  $\frac{x}{x+4}$    c)  $\frac{3}{x-7}$    d)  $\frac{1}{2x}$

## AUFGABE 2



Löse und mache die Probe.    a)  $\frac{10}{x} = 2$     b)  $\frac{18}{x} = 6$     c)  $\frac{8}{x+1} = 2$

### AUFGABE 3



Löse. a)  $\frac{12}{x-3} = 4$  b)  $\frac{15}{2x} = 3$  c)  $\frac{x+2}{x} = 2$

**TIPP** Bei c) mit  $x$  multiplizieren:  $x + 2 = 2x$ .

### AUFGABE 4



Hat die Gleichung  $\frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{x-1}$  eine Lösung? Begründe mit der Definitionsmenge.

## LÖSUNGEN

---

**A1:** a)  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$    b)  $\mathbb{Q} \setminus \{-4\}$    c)  $\mathbb{Q} \setminus \{7\}$    d)  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$

**A2:** a)  $x = 5$    b)  $x = 3$    c)  $8 = 2x + 2, x = 3$

**A3:** a)  $12 = 4x - 12, x = 6$    b)  $15 = 6x, x = 2,5$    c)  $x + 2 = 2x, x = 2$

**A4:** Mal  $(x - 1)$ :  $x + 1 = 2$ , also  $x = 1$ . Aber  $1 \notin D$  (Nenner 0). Keine Lösung:  $L = \{ \}$ .