

Die Sinusfunktion

MATHEMATIK • TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN • HANDOUT UND ÜBUNG


Ein Punkt wandert auf dem Einheitskreis. Seine **Höhe** nennt man den **Sinus**. Trägt man die Höhe über dem Winkel auf, entsteht eine Welle.

1 SINUS AM EINHEITSKREIS UND DER GRAPH

SINUS

$\sin \alpha$ ist die **Höhe** (die y -Koordinate) des Punktes P auf dem Einheitskreis.

$\sin 90^\circ = 1$, $\sin 180^\circ = 0$, $\sin 270^\circ = -1$.




EIGENSCHAFTEN

Periode 2π .

Werte von -1 bis 1 .

Nullstellen $k \cdot \pi$.



$$y = a \cdot \sin(b \cdot x)$$

a streckt in y -Richtung: die **Amplitude**.

b ändert die **Periode**: $\frac{2\pi}{b}$.

BEISPIEL

$y = 3 \cdot \sin(2x)$: Amplitude 3, Periode $\frac{2\pi}{2} = \pi$. Die Werte liegen zwischen -3 und 3 .

TIPP In GeoGebra ist $\sin(90^\circ)$ gleich 1. $\sin(90)$ ohne Gradzeichen rechnet im Bogenmaß und gibt etwa 0,89. Mit π lässt du das Gradzeichen weg, mit Grad schreibst du es hin.

2 ÜBUNGEN

AUFGABE 1



Gib den Wert ohne Hilfsmittel an.

a) $\sin 0$ b) $\sin \frac{\pi}{2}$ c) $\sin \pi$ d) $\sin \frac{3\pi}{2}$ e) $\sin 2\pi$

AUFGABE 2




Gib Amplitude und Periode an.

a) $y = 2 \sin x$ b) $y = \sin(4x)$ c) $y = 0,5 \sin(3x)$

AUFGABE 3



Zeichne den Graphen von $y = 2 \sin x$. Berechne zuerst die Werte für $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$.



AUFGABE 4



Eine Schaukel schwingt mit der Amplitude 0,5 m. Eine Schwingung dauert 4 Sekunden. Die Auslenkung ist $y = a \cdot \sin(b \cdot t)$. Bestimme a und b .

Tipp Die Periode ist $\frac{b}{2\pi} = 4$.

AUFGABE 5



Zusatz (kann entfallen): Für welche x zwischen 0 und 2π gilt $\sin x = 0,5$?

LÖSUNGEN

A1: a) 0 b) 1 c) 0 d) -1 e) 0.

A2: a) Amplitude 2, Periode 2π b) Amplitude 1, Periode $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ c) Amplitude 0,5, Periode $\frac{2\pi}{3}$.

A3: Werte 0, 2, 0, -2 , 0. Die Kurve geht bis 2 hoch und bis -2 tief, Periode 2π .

A4: $a = 0,5$. $\frac{2\pi}{b} = 4$, also $b = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$. Die Gleichung: $y = 0,5 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$.

A5: $x = \frac{\pi}{6}$ und $x = \frac{5\pi}{6}$ (Höhe 0,5 im ersten und im zweiten Viertel).